

Par m. Reybelle
2 avr 1787

Rapport de deux observations
communiquées à l'académie par m. Charreaux
Lieut. de m. Le p. chirurgien du Roi
à Lorris en Gatinois

La p^{re} présente un exemple d'hydrocèle dans la tunique vaginale, guérie par un procédé dont feu m. Sorbani chirurgien d'Orléans se servoit pour la cure radicale de cette maladie. Voici l'exposé de ce moyen: il prenoit un trois-quarts à paracentèse et le plongeoit dans la partie inférieure de la tumeur, et sans blesser le poinçon de la cannule, il pousoit tout de suite de dedans en dehors la tunique vaginale et les tégumens à la distance de deux pouces et demi, de la première ponction; puis retirant le poinçon il introduisoit dans la cannule un fil de plomb, qu'il observoit de s'élever, tandis qu'il retiroit la cannule dans le Sac, pour évacuer l'eau. Cette évacuation obtenue, et la cannule ôtée, il saisissoit les deux extrémités du fil, dont il formoit une anse, en les joignant par deux ou trois tours. L'opération terminée, il faisoit appliquer dans les parties intérieures du Scrotum, Des compresses trempées dans du vin tonique astringent, et dans la suite il prescrivoit Des fomentations avec l'esprit de vin camomille, et ne retiroit son fil que six semaines après. D'ailleurs comme il paroît dans l'exposé, le malade ne s'étoit point exposé à un grand danger.

Le S. M. d'abord habitant de Lorris en Gatinois, qui fait le sujet de l'observation, âgé actuellement de 70 ans, commença à s'appercevoir à l'âge de 52 ans, d'une tumeur dans le côté gauche du Scrotum, qui fut prononcée aux gens de l'art qu'il consulta, qu'il étoit attaqué d'un gonflement



D'hydroïde. Cette tumeur ne fit que des progrès très lents pendant l'espace de 4 ans, époque à laquelle il consulta M.^r Charreauden qui trouvant alors une hydroïde assez volumineuse, lui fit la ponction, et tira environ une chopine d'eau (c'étoit le 4. mars 1779) environ deux ans après il lui fit encore la ponction, et tira un peu moins d'eau. D'après cette décision, le malade sans prévenir son chirurgien, se transporta à Orléans, environ 15 mois après, et se confia à M.^r Bertrand qui lui fit son opération, le lendemain de son arrivée, sans préparations quelconques. Le lendemain le malade se fit transporter à Lorris, distant d'environ 12 lieues, ayant son fist de plomb en place. Au bout d'un mois, le malade éprouvant des douleurs, manda M.^r Charreauden à qui il fit part de l'opération qu'il s'étoit fait faire. Le chirurgien trouva le fist de plomb placé tel qu'il a été dit et disposé, sans gonflement ou scrotum, le testicule cependant un peu douloureux, ce qui le détermina à ôter le fist de plomb. Depuis près de 5 ans, dit l'auteur de l'observation, que le malade a été opéré, il n'a eu aucune décision d'hydroïde et le testicule est en bon état.

Le procédé opératoire que M.^r Charreauden a détaillé dans son observation ne présente rien de neuf, très dangereux dans les hydroïdes les plus simples, bien plus encore dans les compliqués, et conséquemment n'est point admissible, malgré le succès dont il assure qu'il a été suivi.

Si M.^r Charreauden est bien médité l'ouvrage de M.^r Sabathier, sur la cure radicale de l'hydroïde, il auroit aisément reconnu dans les descriptions de l'Académie, l'analogie de la méthode de M.^r Bertrand d'Orléans, avec quelques unes qui y sont exposées. Soit à quoi se réduit cette méthode ? à l'écarter par le moyen

L'Observation dont Je viens de faire le rapport,
me conduisit, mespécure, à vous faire part d'un cas de
hernie fémorale formée par une anse d'intestin, dont l'adhésion
et la séparation ne se sont faites, qu'à une des extrémités
de l'anse, l'autre partie flottante sur le ventre, et n'ayant
souffert d'adhésion par son extrémité correspondante à
l'anneau, que quelques jours après la première. Cette
observation est de feu M^r Moreau, Je l'ai copiée
littéralement d'après ses notes, pour un point en attente
des circonstances, et ne me suis permis aucune addition
de souvenant ou Jugement du tribunal académique
devant lequel J'ai l'honneur de parler.

Une femme âgée de 34 ans portoit depuis
plusieurs années une hernie fémorale sans bandage, parcequ'elle
la faisoit rentrer aisément, elle croyoit qu'elle n'avoit
rien à craindre; mais un jour étant atteinte de
douleurs de colique faussées par la suite de la descente
elle voulut la réduire, mais il ne lui fut pas possible, malgré
toutes ses tentatives; cependant fondée sur la facilité
qu'elle avoit toujours eue jusqu'à ce jour de se débarrasser
elle resta plusieurs jours dans cet état sans faire
aucun remède. alors des vomissemens de matières
stercorales qui avoient commencé, augmentèrent, devinrent
plus fréquens; la tumeur devint plus douloureuse,
l'inflammation s'y manifesta. Un accident quoique très
dangereux, ne la déterminèrent point encore à demander
du secours; la gangrène survint à la tumeur,



La peau s'ouvrit et l'intestin parut sorti non pas fourbi
et en ordre, tel qu'il est ordinairement dans des hernies, mais
long d'un demi-pied; n'étant plus retenu par le mébrure
qui étoit presque totalement détruit, de sorte qu'il étoit sur
le ventre, parce que cette anse qu'il avoit formée d'abord dans
la descente de l'aine, avoit été séparée d'un côté par la
mortification à son commencement sous le ligament de
fallope, et la partie supérieure où cette séparation s'étoit
faite étoit restée attachée à cet endroit, d'où il y avoit aux
matières, ce qui fit presser tous les excréments. Cette malade
fut transportée à l'hôtel-dieu dans cet état; Je remarquai des
matières stercorées autour de la plaie et cette portion d'
intestin qui bloquoit sur le ventre, comme un morceau
de baudin, il n'étoit point affaissé parce que la partie de
l'aine dont il étoit séparé étoit encore retenue et comprimée
par le ligament, l'inflammation étoit continue et
brûloit les membranes très ~~grosses~~ épaisses et lui
faisoit conserver la forme cylindrique. pour m'en assurer
j'introduisis le doigt par l'extrémité dans la cavité et je
sentis distinctement qu'il étoit beaucoup plus épais
que dans son état naturel: après cet examen je jugeai
qu'il falloit séparer cette portion d'intestin en la liant,
et me donnai bien de garde de toucher à la partie de
l'intestin qui étoit fixée sous le ligament, que l'on
n'appercevoit point, parce qu'en portant le doigt dans la
plaie j'aurois dérangé l'adhérence qu'elle avoit contractée, et
qui faisoit un passage aux matières; croyant qu'il se

formeroit un anneau à cet endroit: ainsi, je pris un fil composé
de plusieurs fils et fils, je fis la ligature de cette portion
d'intestin de plus près du ligament qu'il me fut possible;
le panserment fut fait avec un linge trempé dans l'eau
de vie pour l'envelopper, un plumaceau couvert de digestif
sur la plaie, des compresses, et tout maintenu par un
bandage. Le lendemain me étant apperçu qu'il étoit
sorti un travers de doigt d'intestin de plus à l'endroit
où j'avois placé la ligature, et qu'il formoit un
bourrelet qui s'enflapoit de plus, je crus qu'il étoit
plus convenable de faire une nouvelle ligature au dessous
de la 1^{re}, qui dépousser le qui étoit sorti de nouveau,
je craignois de déranger cette portion de l'anus qui étoit
sous le ligament. Je fis donc cette 2^e ligature
très-proche de la peau, elle sépara l'intestin en moins
de 24 heures, et le malade me dit le lendemain
qu'elle avoit été à la selle pendant la nuit. En effet
la portion d'intestin étoit séparée: pour en assurer
je recommandai à la malade, de demander le bassin
quand elle en sentiroit le besoin; ce qui me le confirma
ayant eu deux selles dans le jour. D'où je conclus
que la partie de l'intestin d'où s'étoit fait la 1^{re}
séparation étoit restée attachée au ligament de Fallope
et que la seconde ligature ayant produit le même
effet les deux ouvertures de l'intestin s'étoient affrontées
vis-à-vis l'une de l'autre. Dans la suite le malade ne



gardant point de légine, il sortit par la plaie, un peu
de matière et stercorale quoiqu'elle allât à la selle ce qui
occasionna un prurit autour de la plaie qui obligea de
mettre depuis peu tout médiocrement, un emplâtre de fécule qui
renouvelloit plusieurs fois pour le jour, après s'être nettoyée.

Je me flattois de guérir cette malade entièrement lorsque ne souffrant
plus et stendant peu de matière, l'ennui, l'inquiétude du ménage comparé
de cette femme et elle voulut s'en aller malgré mes instances pour quelle
restât. En partant je lui recommandai surtout de se proposer et de la
sobriété. trois mois après elle vint me voir et me dit qu'il ne l'estoit presque
rien, et que le peu se arrivoit que de temps en temps. Je fis encore un peu possible
pour la déterminer à se lever pour cette maison, afin d'accroître la guérison
en lui faisant garder la légine; mais le peu d'incommodité qu'elle en
suyvoit, fut un motif pour l'en empêcher. elle a été entièrement guérie peu
de temps après.

pour savoir comment s'est faite la réunion de cet intestin dont la longueur
d'un demi-pied a été emportée par la ligature, il faut se représenter ce qui arrive dans
les hernies quand il est gangrené; la séparation en étant faite des deux embouchures
se trouvent vis-à-vis, et demeurent proches l'une de l'autre par la fœbion que l'inflammation
a produite avec l'endroit qui lui a donné passage pour sortir, ce qui contribue
beaucoup à des réunions et à être liées par la suite de l'usage; fort de la même
façon que les deux parties de l'intestin qui font le sujet de cette observation se
sont jointes: la partie supérieure étoit adhérente à l'endroit du ligament
de fellope et donnoit issue aux matières stercorales, l'inférieure qui étoit étendue
sur le ventre ayant été liée, l'inflammation qui y étoit, a été augmentée
et a procuré la fœbion; de sorte qu'étant séparée par la ligature
des deux ouvertures réunies par le même moyen se sont trouvées
proches et vis-à-vis l'une de l'autre, les matières ont passé et la réunion
s'est faite peu à peu, quoiqu'elle n'ait pas été la plus heureuse
attention sur son légine.

Du fil de plomb une inflammation dans l'intérieur du sac
pouvoit opérer ~~l'adhésion~~ l'adhésion des parties. Mais on a porté
il y a longtemps pour la 1^{re} fois des saumures de plomb
dans l'intérieur du sac pour parvenir à ce but, ce qui ~~est~~
n'est pas bien différent; ~~de son procédé~~ ^{de son} ~~procédé~~ ^{procédé} ~~de son~~
~~de saumure~~ ^{de saumure} le procédé doit être placé dans la fosse
des tentes, et nous devons dire à l'avantage des praticiens
qui se servoient de ces 3^{es} moyens, que prévenus des accidents
qui pouvoient en résulter, ils avoient soin de les ôter dès
le 1^{er} jour ~~de~~ invasion. au contraire notre praticien moderne ~~est~~
fait une erreur avec son fil de plomb, de le laisser et prescrit à des
malades de le porter au moins 15 semaines. quant à la
manière dont il place son fil, il a suivi le procédé de m^r
pott simplifié par m^r Sabatier, pour l'introduction du
seton, à la différence, toutes fois, que dans le procédé on a soin
de pousser d'abord la saumure jusqu'à la partie supérieure du
sac, et qu'on ne se détermine à pousser la pointe du bois qu'en
que quand on s'est bien assuré, ~~par~~ de la position de la saumure.
Mais m^r Bontane laisse la pointe de son bois quant à
nué dans l'intérieur du sac, et court les risques de blesser
le testicule dont le rapport de position n'est pas certainement
le même dans toutes les hydrocèles.

Le procédé de m^r Bontane est dangereux, même
dans les hydrocèles des plus simples, la raison et
l'expérience le prouvent. La présence continuelle d'un corps
aussi dur que le fil de plomb sur un organe aussi
sensible que le testicule doit y déterminer de l'inflammation,
du gonflement, une fièvre symptomatique et d'autres
accidents encore plus graves que l'on a rapprochés à l'usage
des tentes. D'ailleurs si la simple introduction du seton

Déterminer, comme on l'a observé plusieurs fois du gonflement
du testicule, au point que le scrotum est comme serré entre la
tunique vaginale et cette partie; que ne doit on pas craindre
de la présence d'un fût de plomb.

La marche des accidens que je viens de citer dans
les hydrocèles simples doit être bien plus rapide dans les
fûts d'hydrocèles où il y a maladie du testicule, épaisissement
ou sac et altération dans les lacs qui y sont contenues.

En partant tous ces accidens, on ne
peut rien conclure en faveur de cette méthode à l'égard
du succès quelle a eu. n'a-t-on pas souvent vu des méthodes
les plus dangereuses et des moins réfléchies être couronnées
du succès. D'ailleurs le malade qui fait le sujet de
l'observation de M^r Charreaudeau, âgé de près de 66 ans,
lors qu'on lui fit l'opération, peut être de ces tempéraments
sèches et humides dans lesquels le principe de la sensibilité
manque d'énergie; ce qui fait que des causes irritantes
y produisent des effets moins remarquables que dans
toute autre constitution.

Par M^r Reibeyrolle

Rapport de M. Bayleville 20 avr 1787

Dans la Seconde observation de M. Charriau deen, il s'agit d'une hernie inguinale avec gangrène d'une anse d'intestin guérie sans aucun frottement dans l'espace de 7. semaines. La femme qui en fait le sujet consulta M. Charriau deen, le 7. février 1786, pour des accidens qu'il reconnut promptement être ceux d'une hernie étranglée. La malade lui dit qu'il n'y avoit pas longtems qu'elle portoit cette maladie. Elle éprouvoit alors des nausées, il y avoit de la fièvre, le ventre étoit tendu, la tumeur étoit dure et élastique. Le Chirurgien tenta de tacher avec ménagement et ne pouvant pas réussir, il lui fit une ample saignée, appliqua des topiques émolliens sur le bas ventre et sur la tumeur. Il étoit alors 6 heures du matin, sur le midi il devint roide la malade, tenta de tacher et parvint à la réduction. à la fin du soir on lui apprit que les accidens persistoient toujours; bien persuadé qu'il n'y avoit plus d'étranglement, il lui fit passer un purgatif laxatif, il y eut des évacuations par les selles, mais des vomissemens persistoient toujours. Le huit, il fit prendre des lavemens purgatifs, point de changement encore. Le 9 et le 10, mêmes moyens administrés et toujours les mêmes accidens. M. Charriau deen se feroit en sûreté, parce que l'anneau lui paroissoit libre, mais l'événement se dérompa, le 11. il survint une inflammation au lieu de l'anneau qui fut suivie de gangrène dès le lendemain, le détachement qu'il fit de l'orbane permit bientôt aux matières de s'évacuer, par la plaie. Le 16, il se présenta une portion d'intestin livide à laquelle le Chirurgien n'observa point d'ouverture, quoique des matières continuaient de



S'écarter. Le lendemain il étoit faite portion que la nature
avoit séparée, qui étoit de la longueur de 3 pouces 4.
Lignes. a cette époque tous les accidens seberent, ce qui
s'observe tous les jours en pareil cas. Les urinaires
continuèrent de couler pendant 13 jours, partie par la
plaie partie par l'anus, et par un régime favorable, peu
sévere. Au la fin, la plaie a été parfaitement consolidée
en 7. Semaines.

En méditant les circonstances de cette hernie
on peut par doute que quoique m.^r Charreaudeau ait
lié la tumeur, il n'y ait encore étranglement par
quelques appendices membranux, soit par quelques
obides épiploïques, soit enfin par le rétrécissement
même des deux bouts d'intestin correspondant aux bords de
de l'anse comprise dans la hernie, comme on en a vu
plusieurs exemples. Sans prétendre faire de reproches
à m.^r Charreaudeau, je crois qu'il n'auroit pas dû
seulant se résigner d'après la liberté de l'anneau,
et qui voyant des accidens persistes quelques jours
après cette réduction illusoire, il l'ait dû consulter à
la malade tout ce qui auroit pu tendre à faire disparaître
la hernie. Quoiqu'il en soit la nature a tant bien
bien servi la malade, qu'on pourroit se désoler. il est
incontestable, pour moi servir des expressions de m.^r Boissier,
dans son mémoire pour la cure des hernies avec
Gangrène, que le succès inspiré que m.^r Charreaudeau
a eu dans cette cure, il l'a dû à la disposition favorable
des adhérences que les parties saines avoient contractées

intérieure dans l'intérieur du ventre, vis-à-vis de l'ombilic
tout ce qui s'est passé dans le cours de cette maladie,
confirme la théorie de la route de l'écoulement acrimonieux.

On doit applaudir à M. Moreau de
l'avoir bien saisi le principe de M. Louis, en ne tenant
point la maladie à un régime trop sévère, sage précaution
pour éviter le stérilissement qui eût été nécessairement
conduit à procurer un nouvel accès.

L'auteur de l'observation paraît étonné de la guérison
d'une pareille hernie et il avoue qu'il n'a vu dans aucun
auteur pas même dans le mémoire de M. Louis aucune
observation semblable à la sienne. S'il avoit parcouru
avec attention cet ouvrage, il y eût vu deux faits de
hernie accompagnés de gangrène d'écoulement d'intestin dont
les plaies ont été parfaitement consolidées, l'une en 15
jours et l'autre en 25. Quoiqu'il en soit on doit s'en
bon gré à M. Moreau de l'avoir communiqué un fait
aussi intéressant et qui ne peut qu'enrichir les fastes
de notre art.



N: 323.